



330074



330074

Laxamín

Picosulfato de Sodio

gotas

VENTA LIBRE
INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿QUÉ CONTIENE LAXAMÍN? Cada 100 ml contiene:

Picosulfato de sodio	750,000 mg
Excipientes	
Acido clorhídrico c.s.p.	pH 6
Agua deionizada c.s.p.	100,000 ml
Nipagin sódico	0,150 g
Sorbitol 70%	50,020 g

ACCIÓN: Laxante estimulante por contacto.

¿PARA QUÉ SE USA LAXAMÍN?

Está indicado para el tratamiento sintomático, de corta duración, en caso de constipación, cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LAXAMÍN?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes, o si usted padece dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos.

LAXAMÍN no debe administrarse a niños menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR LAXAMÍN?

Si se sospecha la existencia de enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa, no se recomienda el uso de laxantes en la preparación de los pacientes que se someterán a un colon por enema.

Si usted está embarazada o amamantando, consulte a un médico antes de utilizar esta droga.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Debido a que el Picosulfato se degrada por acción de las bacterias intestinales, LAXAMÍN puede perder parte de su efecto laxante en aquellos pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro vía oral.



El uso prolongado de laxantes puede producir un desequilibrio de los electrolitos, pérdida de potasio, y puede precipitar la aparición de un estreñimiento de rebote.

Utilizar con cuidado en los casos de deshidratación severa.

Con el uso de laxantes por contacto se ha informado, ocasionalmente, leve malestar abdominal.

La administración prolongada y en dosis altas puede producir diarrea, hipopotasemia.

En el niño la administración de laxantes debe ser excepcional, y debe hacerse con indicación médica.

Si la constipación persiste, o empeora **CONSULTE A SU MÉDICO.**

¿CÓMO SE USA LAXAMÍN?

Adultos: 20 a 40 gotas, preferentemente al acostarse.

Niños de 12 a 15 años: 5 a 10 gotas, preferentemente antes de acostarse.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

En caso de sobredosis accidental o intencional consulte con urgencia a su médico y/o llame a los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 9247

Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese con el Laboratorio: 0800-321-5555 ó con ANMAT
Responde: 0800-333-1234.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 10 ml.

No consumir después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

Conservar a temperatura inferior a 30°C

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°19.853. Elaborado en Sant Gall Friburg,

Av. Brasil 3131/33 (C1260 ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Laboratorios Temis Lostaló S.A., Zepita 3178, C1285ABF, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Rep. Argentina.

Dirección Técnica: Pablo Stahl, Farmacéutico.

Fecha de la última revisión: 02/04/2020

330074



**TEMIS
LOSTALO**