



330467



330467

Tresité F

3-5-3' Triiodotironina Flumetasona

pomada

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA

FÓRMULA:

Cada 100 g de pomada, contienen:

3-5-3' Triiodotironina	400,00 µg
Pivalato de flumetasona	20,00 mg
Excipientes (Laurilsulfato de sodio, Propilenglicol, Alcohol cetílico, Vaselina líquida, Metilparabeno, Propilparabeno, Cera blanca, Cera emulsionante, Agua destilada)	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Corticoide de uso tópico en combinación con triiodotironina de uso tópico. Código ATC: D07XB01

INDICACIÓN:

Tratamiento y prevención del queloide.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar la pomada 2 veces por día con suave masaje digital. El tratamiento debe continuarse por espacio de 2 a 6 meses.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES:

Existen estudios que muestran que el uso de corticoides intralesionales previenen y mejoran el desarrollo de queloides; asimismo, la Triiodotironina tópica entre las acciones que puede producir, estimula el crecimiento de la epidermis y aumento del grosor de la dermis, induce la expresión y aumento del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF), promueve la cicatrización de las heridas por estimular la proliferación de queratina contribuyendo a la curación de los tejidos dañados e incrementa los procesos fisiológicos de anabolismo de la epidermis humana.



CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o excipientes.
Infecciones cutáneas.

PRECAUCIONES:

No debe utilizarse en tuberculosis cutánea, dermatosis sifilítica o virales recientes, agudas y subagudas. No aplicarse sobre la conjuntiva. No ingerir.

REACCIONES ADVERSAS:

En casos aislados puede provocar prurito, ardor, irritación, sequedad de la piel, hipopigmentación, atrofia cutánea local.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una ingesta oral, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/9247
Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS:

No se conocen.

PRESENTACIÓN:

Tubos por 40 g de pomada.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar a temperatura inferior a 25°C

**No utilizar después de la fecha de vencimiento
indicada en el envase**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 25.326
Elaborado en Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178, C1285ABF, C.A.B.A., República Argentina.
Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

En Ecuador:

Importado y distribuido en Ecuador por Eurostaga S.A.
Conservar a temperatura no mayor a 30° C

Fecha de última revisión: 17/06/2013

330467



**TEMIS
LOSTALÓ**